

Accueil Grade A au Trauma Center

Rédaction	Dr Thomas Lebouvier	Version	1
Validation	Commission Médicale TRYBU	Application	24/05/18

IADE TÊTE

DROGUES

Adrénaline 5 mg = 5 ml soit 1 mg/ml
Noradrénaline PSE 8 mg = 32 ml soit 0,25 mg/ml
Ephédrine 30 mg = 10 ml soit 3 mg/ml
Etomidate 20 mg = 20 ml soit 2 mg/ml
Midazolam PSE 50 mg = 50 ml soit 1 mg/ml
Célocurine 100 mg = 10 ml soit 10 mg/ml
Nimbex 20 mg = 10 ml soit 2 mg/ml
Sufentanyl PSE 50 µg = 50 ml soit 1 µg/ml

Compresses pour pré-champ

AIRWAY

Sonde IOT basse P° n° 7 - 7,5
 Guedel n°3 et n°4
 Laryngo lame métal n°4
 Mandrin rigide / Eschmann / Cook
 Seringue 20ml
 Ligne de capnie
 Stéthoscope
 Lacet de fixation

TEMPS PRÉPARATION
20 MIN À 2 PERSONNES

SCOPE
PSE
VENTILATEUR

MAR LEADER

- Clinique
- Fast écho
- Décision

MAR TECHNICAGE

PRÉPARATION TABLE

- KTC 3 voies fémoral (controlatéral lésions MI)
- KT artériel fémoral

PRÉLÈVEMENT DU BILAN BIO

GR/RH/NFS/GDS/Lactates/Iono sang/TP/TCA/Fibrinogène

AS + BRANCARDIER

Plan dur installé
 Bair Hugger (under body) allumé
 Déshabillage
 Entrée administrative
 Identification
 Toilette / rasage
 Prise de Température

IADE TRANSFUSION

TRANSFUSION HÉMOSTASE

- Pack EFS O⁺ sauf Femme en âge de procréer
- Fibrinogène 2 X 1,5 gr
- Exacyl 1 g puis PSE 1 g=40 ml/8 h soit 5 ml/h
- Chlorure de Ca²⁺ 1 g =10 ml

VOIE D'ABORD

2^{ème} VVP gros calibre

Fluido monté

MANIP RADIO PRÉSENT À L'ARRIVÉE DU PATIENT
CASSETTE CHARGÉE DANS LE BRANCARD